

Correction EDHEC 2007

Voie scientifique

La correction comporte 24 pages.

Exercice 1

1. Pour tout entier n non nul, la fonction $x \mapsto \frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}}$ est continue sur \mathbb{R}_+ en tant que quotient (dont le dénominateur ne s'annule pas sur cet ensemble) de telles fonctions. Ainsi l'intégrale définissant u_n ne présente qu'une impropriété, en $+\infty$.

Comme la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1}{x + \frac{1}{n}}$ est strictement décroissante sur \mathbb{R}_+ , nous avons :

$$\forall x \geq 0, \quad \varphi(x) \leq \varphi(0) = n$$

et :

$$\forall x \geq 0, \quad \frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} \leq ne^{-x}$$

avec :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} ne^{-x} dx &= n\Gamma(1) \\ &= n \end{aligned}$$

L'intégrale $\int_0^{+\infty} ne^{-x} dx$ converge donc. Le critère de majoration appliqué aux fonctions positives permet de conclure que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} \text{ converge et la suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ est bien définie}$$

2. _

(a) Nous avons :

$$\forall x \geq 1, \quad \frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} \leq \frac{e^{-x}}{x} \text{ car } x + \frac{1}{n} \geq x \implies \frac{1}{x + \frac{1}{n}} \leq \frac{1}{x} \text{ et } e^{-x} > 0$$

$$\forall x \geq 1, \quad \frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} \leq e^{-x} \text{ car } x \geq 1 \implies \frac{1}{x} \leq 1$$

alors comme toutes les fonctions en jeu sont continues sur $[1, +\infty[$, la croissance de l'intégrale nous donne :

$$\begin{aligned} \forall A \geq 1, \quad \int_1^A \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} &\leq \int_1^A e^{-x} dx \\ &\leq [-e^{-x}]_1^A \\ &\leq (e^{-1} - e^{-A}) \end{aligned}$$

Le théorème de prolongement des inégalités, nous permet d'écrire, comme :

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} \text{ par cvce de l'intégrale et } \lim_{A \rightarrow +\infty} (e^{-1} - e^{-A}) = e^{-1}$$

que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} \leq e^{-1}$$

soit :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, w_n \leq e^{-1} \quad (1)$$

Enfin la positivité de l'intégrale, les bornes étant bien rangées, permet d'écrire que :

$$\forall A \geq 1, 0 \leq \int_1^A \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}}$$

et par passage à la limite quand A tend vers $+\infty$ (*théorème de prolongement des inégalités*) :

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} \\ \text{soit } 0 &\leq \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} \\ \text{ou encore } 0 &\leq w_n \end{aligned} \quad (2)$$

Conclusion : selon (1) et (2)

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq w_n \leq e^{-1}}$$

(b) La fonction $\psi : x \mapsto e^{-x}$ est décroissante sur $[0, 1]$, donc $\forall x \in [0, 1], \psi(x) \geq \frac{1}{e}$, ainsi :

$$\frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} \geq \frac{1}{e} \frac{1}{x + \frac{1}{n}}$$

alors par continuité de toutes les fonctions en jeu sur le segment $[0, 1]$, les bornes sont bien rangées, la croissance de l'intégrale nous donne :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 \frac{e^{-x} dx}{x + \frac{1}{n}} &\geq \frac{1}{e} \int_0^1 \frac{dx}{x + \frac{1}{n}} \\ &\geq \frac{1}{e} \ln \left[x + \frac{1}{n} \right]_0^1 \\ &\geq \frac{1}{e} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \ln \left(\frac{1}{n} \right) \right) \\ &\geq \frac{1}{e} (\ln(n+1) - \ln n + \ln n) \\ &\geq \frac{1}{e} \ln(n+1) \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n \geq \frac{1}{e} \ln(n+1)}$$

(c) Comme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e} \ln(n+1) = +\infty$$

le *théorème de comparaison* nous donne :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$$

D'autre part la *relation de Chasles* nous permet d'écrire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = v_n + w_n$$

où la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée, alors selon l'*algèbre des limites* :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n \\ &= \boxed{+\infty} \end{aligned}$$

3. _

- (a) La fonction $\theta : x \mapsto \frac{1 - e^{-x}}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ en tant que quotient (dont le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle) de telles fonctions. L'intégrale présente donc une impropriété en 0. Or comme :

$$\frac{1 - e^{-x}}{x} \underset{0}{\sim} \frac{x}{x}$$

(car $e^{-x} - 1 \underset{0}{\sim} -x$) alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{x} = 1$ et θ est prolongeable par continuité en 0 en posant $\theta(0) = 1$.

Ainsi $\int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x} dx$ est faussement impropre en 0 et est donc convergente

- (b) Il est clair que :

$$\begin{aligned} \forall x \in]a, 1], \quad \text{où } a \in]0, 1[, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad x + \frac{1}{n} &\geq x \\ \text{donc } \frac{1}{x + \frac{1}{n}} &\leq \frac{1}{x} \quad \text{car } t \mapsto \frac{1}{t} \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{R}_+^* \\ \text{alors } \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} &\leq \frac{1 - e^{-x}}{x} \quad (\text{en multipliant par } 1 - e^{-x} \geq 0 \text{ sur }]a, 1]) \end{aligned}$$

En intégrant membre à membre, les deux fonctions en jeu étant continues sur l'intervalle d'intégration $]a, 1]$, les bornes étant rangées car $a < 1$, la croissance de l'intégrale nous permet de dire que :

$$\int_a^1 \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx \leq \int_a^1 \frac{1 - e^{-x}}{x} dx$$

Sachant que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx = \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx \quad \text{et} \quad \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 \frac{1 - e^{-x}}{x} dx = \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x} dx$$

par convergence des intégrales, le *théorème de prolongement des inégalités* nous donne :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx \leq \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x} dx$$

Enfin comme $\forall x \in [0, 1], \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} \geq 0$, par positivité de l'intégrale, les bornes étant bien rangées, nous avons finalement :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx \leq \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x} dx \quad (3)$$

(c) Par définition de v_n , nous avons :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1 - e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{x + \frac{1}{n}} dx - \int_0^1 \frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x + \frac{1}{n}} dx - v_n \end{aligned}$$

alors selon (3) nous avons :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq \int_0^1 \frac{1}{x + \frac{1}{n}} dx - v_n \leq I$$

soit :

$$\int_0^1 \frac{1}{x + \frac{1}{n}} dx - I \leq v_n \leq \int_0^1 \frac{1}{x + \frac{1}{n}} dx$$

ou encore :

$$\begin{aligned} &\left[\ln \left(x + \frac{1}{n} \right) \right]_0^1 - I \leq v_n \leq \left[\ln \left(x + \frac{1}{n} \right) \right]_0^1 \\ \implies &\ln(n+1) - I \leq v_n \leq \ln(n+1) \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \ln(n+1) - I \leq v_n \leq \ln(n+1)} \quad (4)$$

(d) Comme précédemment vu, nous savons que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée, et comme v_n tend vers $+\infty$ nous pouvons écrire que :

$$w_n = o_{+\infty}(v_n)$$

Ainsi :

$$v_n + w_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$$

soit donc :

$$u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n \text{ car } u_n = v_n + w_n \quad (5)$$

Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln n \geq 0$, (4) entraîne que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{\ln(n+1) - I}{\ln n} \leq \frac{v_n}{\ln n} \leq \frac{\ln(n+1)}{\ln n}$$

avec :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n+1) - I}{\ln n} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1$$

puisque :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I}{\ln n} = 0$$

et :

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln \left(n \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)}{\ln n} \\ &= \frac{\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \\ &= 1 + \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \end{aligned}$$

avec :

$$\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$$

Le *théorème d'encadrement* permet de dire que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{\ln n} = 1$$

ce qui équivaut à dire, selon la caractérisation des suites équivalentes, que :

$$v_n \underset{+\infty}{\sim} \ln n \tag{6}$$

Conclusion : selon (5), (6) par transitivité de \sim

$$\boxed{u_n \underset{+\infty}{\sim} \ln n}$$

Exercice 2

1. Tout d'abord la famille (I, J, K, L) est génératrice de E par définition de l'énoncé. Il nous reste plus qu'à démontrer qu'elle est libre. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, tel que $aI + bJ + cK + dL = 0$, montrons que $a = b = c = d = 0$. La combinaison linéaire nulle s'écrit :

$$\begin{pmatrix} a & -b & -c & d \\ b & a & -d & -c \\ c & d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix} = 0_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$$

ce qui entraîne que :

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \\ d = 0 \end{cases}$$

et la famille est donc libre. Comme son cardinal vaut 4, nous pouvons dire que :

$$\boxed{(I, J, K, L) \text{ est une base de } E \text{ et } \dim E = 4}$$

2. _

- (a) Sans commentaire particulier, on trouve :

$$\boxed{\begin{array}{l} JK = L \\ KL = J \\ LJ = K \end{array}} \tag{7}$$

- (b) De même :

$$\boxed{J^2 = -I \quad K^2 = -I \quad L^2 = -I} \tag{8}$$

Nous en déduisons que :

- $\boxed{KJ = K^2L = -L}$ selon (7) et (8)
- $\boxed{LK = L^2J = -J}$ selon (7) et (8)
- $\boxed{JL = KL^2 = -K}$ selon (7) et (8)

- (c) Soit M et M' deux matrices de E , elles s'écrivent donc chacune sous forme de combinaison linéaire des matrices I, J, K, L .

$$\begin{aligned} \exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid M &= aI + bJ + cK + dL \\ \exists (a', b', c', d') \in \mathbb{R}^4 \mid M' &= a'I + b'J + c'K + d'L \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} MM' &= (aI + bJ + cK + dL)(a'I + b'J + c'K + d'L) \\ &= dd'L^2 + bb'J^2 + cc'K^2 + aa'I + bd'JL + cd'KL + bc'JK + cb'JK \\ &\quad + db'JL + dc'KL + ad'L + ab'J + a'bJ + ac'K + ca'K + a'dL \\ &= -dd'I - bb'I - cc'I + aa'I - bd'K + cd'J + bc'L + cb'L \\ &\quad - db'K + dc'J + ad'L + ab'J + a'bJ + ac'K + ca'K + a'dL \\ &= (-dd' - bb' - cc' + aa')I + (cd' + dc' + ab' + a'b)J \\ &\quad + (-bd' - db' + ac' + ca')K + (bc' + cb' + ad' + a'd)L \end{aligned}$$

Comme nous avons pu exprimer MM' comme combinaison linéaire des vecteurs de la base (I, J, K, L) de E , nous pouvons conclure que :

$$\boxed{E \text{ est stable pour le produit matriciel}}$$

3. Comme les matrices J et K ne sont pas commutantes, nous devons faire attention dans le calcul et :

$$\begin{aligned} A^2 &= (J + K)^2 \\ &= J^2 + JK + KJ + K^2 \\ &= -I + L - L - I \\ &= \boxed{-2I} \end{aligned}$$

ce qui s'écrit aussi :

$$A \left(-\frac{1}{2}A \right) = I$$

Nous avons donc pu trouver une matrice carrée d'ordre 4 notée B qui commute avec A telle que :

$$AB = BA = I$$

Ainsi A est inversible avec :

$$\boxed{A^{-1} = -\frac{1}{2}A}$$

4. _

- (a) Comme l'ensemble E est stable pour le produit matriciel et que A, M et A^{-1} en sont éléments, alors $\varphi_A(M) \in E$. D'autre part pour tout couple (M, M') de matrices de E et pour tout couple de réels (a, b) , nous avons :

$$\begin{aligned} \varphi_A(aM + bM') &= A(aM + bM')A^{-1} \\ &= aAMA^{-1} + bAM'A^{-1} \text{ en développant} \\ &= a\varphi_A(M) + b\varphi_A(M') \end{aligned}$$

et φ_A est bien une application linéaire.

Conclusion :

$$\boxed{\varphi_A \text{ est bien un endomorphisme de } E}$$

- (b) Par définition :

$$\ker \varphi_A = \{M \in E \mid \varphi_A(M) = 0\}$$

Or :

$$\begin{aligned} \varphi_A(M) = 0 &\iff AMA^{-1} = 0 \\ &\iff A^{-1}AMA^{-1}A = 0 \\ &\iff M = 0 \end{aligned}$$

et :

$$\boxed{\ker \varphi_A = 0} \quad (9)$$

L'égalité (9) équivaut à dire que φ_A est injective et comme nous travaillons en dimension finie, cela revient à dire que φ_A est bijective, autrement dit :

$$\boxed{\varphi_A \text{ est un automorphisme de } E}$$

5. _

(a) Pour écrire Φ_A la matrice de φ_A dans la base (I, J, K, L) nous nous devons de calculer les images $\varphi_A(I)$, $\varphi_A(J)$, $\varphi_A(K)$ et $\varphi_A(L)$ que l'on exprimera en fonction de I, J, K et L .

• Nous avons :

$$\begin{aligned} \varphi_A(I) &= AIA^{-1} \\ &= I \end{aligned} \quad (10)$$

• Nous avons :

$$\begin{aligned} \varphi_A(J) &= AJA^{-1} \\ &= -\frac{1}{2}(J+K)J(J+K) \\ &= -\frac{1}{2}(J^2+KJ)(J+K) \\ &= -\frac{1}{2}(J^3+J^2K+KJ^2+KJK) \\ &= -\frac{1}{2}(-J-K-K-LK) \\ &= -\frac{1}{2}(K-K-K+J) \\ &= -\frac{1}{2}(-2K) \\ &= K \end{aligned} \quad (11)$$

• Nous avons :

$$\begin{aligned} \varphi_A(K) &= AKA^{-1} \\ &= -\frac{1}{2}(J+K)K(J+K) \\ &= -\frac{1}{2}(JK+K^2)(J+K) \\ &= -\frac{1}{2}(JKJ+K^2J+JK^2+K^3) \\ &= -\frac{1}{2}(LJ-J-J-K) \\ &= -\frac{1}{2}(K-J-J-K) \\ &= -\frac{1}{2}(-2J) \\ &= J \end{aligned} \quad (12)$$

- Nous avons :

$$\begin{aligned}
 \varphi_A(L) &= ALA^{-1} \\
 &= -\frac{1}{2}(J+K)L(J+K) \\
 &= -\frac{1}{2}(JL+KL)(J+K) \\
 &= -\frac{1}{2}(JLJ+KLJ+JLK+KJK) \\
 &= -\frac{1}{2}(JK+K^2-J^2-KJ) \\
 &= -\frac{1}{2}(L-I+I+L) \\
 &= -\frac{1}{2}(2L) \\
 &= -L
 \end{aligned} \tag{13}$$

Selon (10), (11), (12) et (13) :

$$\Phi_A = \text{mat}(\varphi_A, (I, J, K, L)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- (b) Selon (10) et (11) nous pouvons d'ores et déjà dire que -1 et 1 sont deux valeurs propres de Φ_A et comme cette dernière est clairement inversible (il suffit d'inverser les deux colonnes centrales pour voir que $\text{rg}\Phi_A = 4$), 0 n'est pas valeur propre. Mais cela ne nous donne pas les autres valeurs propres éventuelles, c'est pourquoi nous reviendrons à la définition classique d'une valeur propre ce qui nous amènera à résoudre un système homogène. λ est une valeur propre de Φ_A si et seulement si $\Phi_A - \lambda I$ est non inversible avec :

$$\Phi_A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

Effectuons l'opération élémentaire $L_2 \leftrightarrow L_3$ alors :

$$\Phi_A - \lambda I \sim \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

puis l'opération $L_3 \leftarrow L_3 + \lambda L_2$

$$\Phi_A - \lambda I \sim \sim \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$\Phi_A - \lambda I$ est non inversible si et seulement si la réduite de Gauss obtenue est non inversible, soit si et seulement si l'un (au moins) de ses coefficients diagonaux est nul, c'est-à-dire si et seulement si $\lambda \in \{-1, 1\}$.

Conclusion :

$$\boxed{\text{sp}(\Phi_A) = \{-1, 1\}}$$

Déterminons $E_{-1}(\Phi_A)$ et $E_1(\Phi_A)$ les sous-espaces propres associés respectivement associés à

-1 et 1 avec :

$$\begin{aligned}
 E_1(\Phi_A) &= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}) \mid \Phi_A(X) = X \right\} \\
 &= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}) \mid y - z = 0 \text{ et } -2t = 0 \right\} \\
 &= \boxed{\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)} \tag{14}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_{-1}(\Phi_A) &= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}) \mid \Phi_A(X) = -X \right\} \\
 &= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}) \mid 2x = 0 \text{ et } y + z = 0 \right\} \\
 &= \boxed{\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)} \tag{15}
 \end{aligned}$$

Selon (14) et (15) : $\dim E_1(\varphi_A) = \dim E_{-1}(\varphi_A) = 2$ et comme $\dim E = 4$, nous avons :

$$\dim E_1(\varphi_A) + \dim E_{-1}(\varphi_A) = \dim E$$

ce qui permet de dire que :

$$\boxed{\varphi_A \text{ est diagonalisable}}$$

6. _

- (a) C'est une démonstration classique de cours. Notons $P = (p_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket}$, $Q = (q_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket}$ deux matrices de E , R la matrice produit $PQ = (r_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket}$ et enfin S le produit $QP = (s_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket}$ avec par définition :

$$\begin{aligned}
 \forall (i, j) \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad r_{ij} &= \sum_{k=1}^4 p_{ik} q_{kj} \\
 \forall (i, j) \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad s_{ij} &= \sum_{k=1}^4 q_{ik} p_{kj}
 \end{aligned}$$

Dans ce cas :

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(PQ) &= \sum_{i=1}^4 r_{ii} \\
 &= \sum_{i=1}^4 \sum_{k=1}^4 p_{ik} q_{ki} \\
 &= \sum_{k=1}^4 \sum_{i=1}^4 p_{ik} q_{ki} \text{ en inversant l'ordre de sommation} \\
 &= \sum_{k=1}^4 \sum_{i=1}^4 q_{ki} p_{ik} \text{ par commutativité du produit dans } \mathbb{R} \\
 &= \sum_{k=1}^4 s_{kk} \\
 &= \operatorname{tr}(QP)
 \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\forall (P, Q) \in E^2, \quad \operatorname{tr}(PQ) = \operatorname{tr}(QP)$$

(b) Avant de commencer, signalons que la matrice A vaut :

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Ainsi nous constatons que ${}^t A = -A$, on dit que A est **antisymétrique**.
 φ_A est un endomorphisme symétrique si et seulement si :

$$\forall (P, Q) \in E^2, \quad (\varphi_A(P) | Q) = (P | \varphi_A(Q))$$

Or :

$$\begin{aligned}
 (\varphi_A(P) | Q) &= \operatorname{tr}({}^t \varphi_A(P) Q) \\
 &= \operatorname{tr}({}^t (APA^{-1}) Q) \\
 &= -\frac{1}{2} \operatorname{tr}({}^t (APA) Q) \\
 \text{car } A^{-1} &= -\frac{1}{2} A, \quad {}^t(\alpha A) = \alpha {}^t A \text{ et par linéarité de la trace} \\
 &= -\frac{1}{2} \operatorname{tr}({}^t (A) ({}^t P) ({}^t A) Q) \text{ par propriété de la transposition} \\
 &= -\frac{1}{2} \operatorname{tr}((-A) ({}^t P) (-A) Q) \text{ car } A \text{ est antisymétrique} \\
 &= -\frac{1}{2} \operatorname{tr}(A {}^t P A Q) \tag{16}
 \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned}
 (P | \varphi_A(Q)) &= \operatorname{tr}({}^t P \varphi_A(Q)) \\
 &= -\frac{1}{2} \operatorname{tr}({}^t P A Q A) \\
 &= -\frac{1}{2} \operatorname{tr}(A {}^t P A Q) \text{ car } \operatorname{tr}(BC) = \operatorname{tr}(CB) \tag{17}
 \end{aligned}$$

Conclusion : selon (16) et (17)

$$\forall (P, Q) \in E^2, (\varphi_A(P) | Q) = (P | \varphi_A(Q)) \text{ et } \varphi_A \text{ est un endomorphisme symétrique}$$

- (c) Comme nous venons de voir que φ_A est un endomorphisme symétrique, le cours nous dit qu'il est diagonalisable (Φ_A n'est constitué que de réels) ce qui a été confirmé au 5.a et que ses sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux. Or comme ceux-ci sont $\ker(\varphi_A - id)$ et $\ker(\varphi_A + id)$ alors :

$$\ker(\varphi_A - id) \text{ et } \ker(\varphi_A + id) \text{ sont supplémentaires orthogonaux dans } E$$

Exercice 3

1. Nous savons que les variables de la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ sont iid¹ de loi commune la loi exponentielle de paramètre 1 qui, d'après le cours, s'identifie totalement à la loi grand gamma de paramètres 1 et 1. Alors par *stabilité* de cette dernière pour la somme de *variables indépendantes* nous pouvons écrire que :

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \hookrightarrow \Gamma(1, n)$$

Toujours d'après le cours :

$$\mathbf{E}(S_n) = n \text{ et } \mathbf{V}(S_n) = n$$

2. Utilisons le *théorème de la limite centrée* dont voici le rappel :

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé. On suppose que les variables sont **iid**, de loi commune pas forcément connue, admettant une espérance m et une variance σ^2 non nulle. Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n X_k \text{ et } S_n^* = \frac{S_n - \mathbf{E}(S_n)}{\sigma(S_n)}$$

alors :

$$(S_n^*)_{n \in \mathbb{N}^*} \xrightarrow{\mathcal{L}} N \text{ où } N \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

Ce qui entraîne que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}([S_n^* \leq x]) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

En appliquant cela à notre variable S_n nous obtenons :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}([S_n \leq n]) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\left[\frac{S_n - \mathbf{E}(S_n)}{\sigma(S_n)} \leq \frac{n - n}{\sigma(S_n)}\right]\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}([S_n^* \leq 0]) \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Conclusion : nous avons bien

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}([S_n \leq n]) = \frac{1}{2} \quad (18)$$

3. Il est clair que pour tout entier n non nul, $\mathbf{P}([S_n \leq n]) = F_{S_n}(n)$ où F_{S_n} est la fonction de répartition de la variable S_n définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_{S_n}(x) = \int_{-\infty}^x f_{S_n}(t) dt$$

¹Indépendantes et indistinctement distribuées.

où f_{S_n} est une densité de S_n que nous pouvons prendre égale à :

$$f_{S_n}(x) = \begin{cases} \frac{x^{n-1}e^{-x}}{\Gamma(n)} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([S_n \leq n]) &= F_{S_n}(n) \\ &= \int_{-\infty}^n f_{S_n}(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^0 f_{S_n}(t) dt + \int_0^n f_{S_n}(t) dt \text{ par Chasles} \\ &= 0 + \int_0^n \frac{t^{n-1}e^{-t}}{\Gamma(n)} dt \\ &= \int_0^n \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} dt \end{aligned} \quad (19)$$

Conclusion : selon (18) et (19)

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} dt = \frac{1}{2}}$$

4. _

- (a) Comme le nombre rationnel $\frac{1}{2}$ est non nul le résultat de la question précédente permet d'écrire que :

$$\int_0^n \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \quad (20)$$

Effectuons un changement de variable de variable affine dans l'intégrale, donc licite, car de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, n]$: $z = \frac{t}{n}$ alors $dz = \frac{dt}{n}$ et :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^n \frac{t^{n-1}e^{-t}}{(n-1)!} dt &= \int_0^1 \frac{(nz)^{n-1} e^{-nz}}{(n-1)!} n dz \\ &= \int_0^1 \frac{n^n z^{n-1} e^{-nz}}{(n-1)!} dz \\ &= \int_0^1 \frac{n^{n+1} z^{n-1} e^{-nz}}{n(n-1)!} dz \\ &= \int_0^1 \frac{n^{n+1} z^{n-1} e^{-nz}}{n!} dz \\ &= \frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^1 z^{n-1} e^{-nz} dz \end{aligned}$$

Alors () nous donne :

$$\begin{aligned} &\frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^1 z^{n-1} e^{-nz} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \\ \Rightarrow &\frac{n!}{n^{n+1}} \frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^1 z^{n-1} e^{-nz} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \frac{n!}{n^{n+1}} \text{ par compatibilité de } \sim \text{ avec le produit} \\ \Rightarrow &\int_0^1 z^{n-1} e^{-nz} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \frac{n!}{n^{n+1}} \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\boxed{\int_0^1 z^{n-1} e^{-nz} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n!}{2n^{n+1}}}$$

(b) Nous admettons que $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$ (**formule de James Stirling**) alors :

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{n^{n+1} z^{n-1} e^{-nz}}{n!} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}}{2n^{n+1}} \\ \Rightarrow & \int_0^1 \frac{n^{n+1} z^{n-1} e^{-nz}}{n!} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2\pi n} e^{-n}}{2n} \\ \Rightarrow & \int_0^1 \frac{n^{n+1} z^{n-1} e^{-nz}}{n!} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi} e^{-n}}{\sqrt{2n}} \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\boxed{\int_0^1 \frac{n^{n+1} z^{n-1} e^{-nz}}{n!} dz \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} e^{-n}}$$

Problème

Partie I

1. _

(a) Appliquons la *formule des probabilités totales* associée au système complet d'événements (U, \bar{U}) de probabilités non nulles, égales à $\frac{1}{2}$, puisque les urnes sont équiprobables du fait qu'elles sont choisies au hasard. Cela donne :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([X = 1]) &= \mathbf{P}_U([X = 1]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}([X = 1]) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \mathbf{P}_U(\bar{B}_1) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(\bar{B}_1) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \times \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

(b) Encore une fois utilisons la *formule des probabilités totales* associée au même système complet d'événements utilisé à la question précédente, et :

$$\begin{aligned} \forall k \geq 2, \mathbf{P}([X = k]) &= \mathbf{P}_U([X = k]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}([X = k]) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k)) \quad (21) \end{aligned}$$

Faisons une pause pour expliquer les calculs :

$$\mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) = \left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \frac{n-1}{n} \quad (22)$$

car l'urne U étant choisie au départ, tous les tirages s'y font, et ceux-ci donnent des résultats indépendants du fait que les tirages se font avec remise. Pour vous convaincre du résultat,

voici la démonstration :

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \overline{B_k}) \\
 = & \frac{\mathbf{P}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \overline{B_k} \cap U)}{\mathbf{P}(U)} \text{ par définition d'une probabilité conditionnelle} \\
 = & \frac{\mathbf{P}(U) \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_{U \cap B_1}(B_2) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(\overline{B_k})}{\mathbf{P}(U)} \\
 & \text{selon la formule des probas composées} \\
 = & \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_{U \cap B_1}(B_2) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(\overline{B_k}) \\
 = & \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_U(B_2) \mathbf{P}_U(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_U(B_{k-1}) \mathbf{P}_U(\overline{B_k}) \\
 & \text{car les tirages étant effectués avec remise, les résultats ne dépendent pas des boules} \\
 & \text{précédemment obtenues mais seulement de l'urne dans laquelle ils sont effectués} \\
 = & \underbrace{\frac{1}{n} \times \dots \times \frac{1}{n}}_{k-1 \text{ termes}} \times \frac{n-1}{n}
 \end{aligned}$$

De même :

$$\mathbf{P}_{\overline{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \overline{B_k}) = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} \quad (23)$$

Conclusion : selon (21), (22) et (23)

$$\forall k \geq 2, \quad \mathbf{P}([X = k]) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \left(\frac{n-1}{n}\right) + \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} \right)$$

Pour $k = 1$, l'expression donne :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n}\right)^{1-1} \left(\frac{n-1}{n}\right) + \left(\frac{n-1}{n}\right)^{1-1} \frac{1}{n} \right) &= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} \right) \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

et donc :

$$\forall k \geq 1, \quad \mathbf{P}([X = k]) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \left(\frac{n-1}{n}\right) + \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} \right)$$

2. X admet une espérance si et seulement si la série de terme général :

$$k \mathbf{P}([X = k]) = \frac{k}{2} \left(\left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \left(\frac{n-1}{n}\right) + \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} \right) \quad \text{où } k \geq 1$$

est convergente. La convergence est assurée par le fait que $k \mathbf{P}([X = k])$ s'exprime comme combinaison linéaire de termes généraux de séries dérivées de séries géométriques de raisons $\frac{1}{n}$ et $\frac{n-1}{n}$

en valeur absolue strictement inférieures à 1. Ainsi X admet une espérance égale à :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}(X) &= \sum_{k \geq 1} \frac{k}{2} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \binom{n-1}{n} + \left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} \frac{1}{n} \right) \\
 &= \sum_{k \geq 1} \frac{k}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \binom{n-1}{n} + \sum_{k \geq 1} \frac{k}{2} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} \frac{1}{n} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n} \right) \sum_{k \geq 1} k \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} + \frac{1}{2n} \sum_{k \geq 1} k \left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n} \right) \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{2n} \frac{1}{\left(1 - \frac{n-1}{n}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n} \right) \frac{n^2}{(n-1)^2} + \frac{n^2}{2n} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{n^2}{n-1}
 \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\mathbf{E}(X) = \frac{n^2}{2(n-1)}$$

3. Montrons que X et Y suivent la même loi. Connaissant la loi de X , il nous faut chercher la loi de Y . Tout d'abord $Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

- Nous avons toujours par la *formule des probabilités totales* :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}([Y = 1]) &= \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1) \mathbf{P}(\bar{U}) \\
 &= \frac{1}{n} \times \frac{1}{2} + \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned} \tag{24}$$

- Pour tout $k \geq 2$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}([Y = k]) &= \mathbf{P}_U([Y = k]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}([Y = k]) \mathbf{P}(\bar{U}) \\
 &= \mathbf{P}_U(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{k-1} \cap B_k) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{k-1} \cap B_k) \mathbf{P}(\bar{U}) \\
 &= \frac{1}{2} (\mathbf{P}_U(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{k-1} \cap B_k) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{k-1} \cap B_k)) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \left(\frac{n-1}{n} \right) \right)
 \end{aligned} \tag{25}$$

en utilisant le même raisonnement qu'au **1.b**

Selon (24) et (25)

$$\begin{aligned}
 \forall k \geq 1, \mathbf{P}([Y = k]) &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \binom{n-1}{n} + \left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} \frac{1}{n} \right) \\
 &= \mathbf{P}([X = k])
 \end{aligned}$$

Conclusion :

X et Y suivent la même loi

Ce résultat est tout à fait normal vu la symétrie des contenus des urnes U et V dans lesquelles les tirages sont toujours effectués, sans changement à partir du premier tirage, ce qui aurait pu nous éviter d'effectuer la démonstration précédente.

4. Les instructions manquantes sont :

Repeat $x := x + 1$; tirage := random(n); until (tirage > 0);

Partie II

1. _

- (a) Le protocole n'intervenant qu'à partir du second tirage, le résultat est exactement le même que celui obtenu dans **I.1.a** (avec le même raisonnement) :

$$\mathbf{P}([X = 1]) = \frac{1}{2}$$

- (b) Utilisons la formule des probabilités totales associée au système complet d'événements (U, \bar{U}) , cela donne :

$$\begin{aligned} \forall k \geq 2, \mathbf{P}([X = k]) &= \mathbf{P}_U([X = k]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}([X = k]) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k)) \end{aligned} \quad (26)$$

Avec, comme dans la partie 1 :

$$\begin{aligned} &\mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \\ &= \frac{\mathbf{P}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k \cap U)}{\mathbf{P}(U)} \text{ par définition} \\ &= \frac{\mathbf{P}(U) \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_{U \cap B_1}(B_2) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(\bar{B}_k)}{\mathbf{P}(U)} \\ &\text{selon la formule des probas composées} \\ &= \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_{U \cap B_1}(B_2) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{U \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(\bar{B}_k) \\ &= \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_{B_1}(B_2) \mathbf{P}_{B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{B_{k-1}}(\bar{B}_k) \\ &\text{car selon les modalités des tirages dans cette partie, les différentes probabilités conditionnelles} \\ &\text{se simplifient en ne tenant compte que de la couleur de la boule obtenue au tirage précédent} \\ &= \underbrace{\frac{1}{n} \times \dots \times \frac{1}{n}}_{k-1 \text{ termes}} \times \frac{n-1}{n} \\ &= \left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \left(\frac{n-1}{n}\right) \end{aligned} \quad (27)$$

En revanche :

$$\begin{aligned} &\mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \\ &= \frac{\mathbf{P}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k \cap \bar{U})}{\mathbf{P}(\bar{U})} \text{ par définition} \\ &= \frac{\mathbf{P}(\bar{U}) \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1) \mathbf{P}_{\bar{U} \cap B_1}(B_2) \mathbf{P}_{\bar{U} \cap B_1 \cap B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{\bar{U} \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{\bar{U} \cap B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(\bar{B}_k)}{\mathbf{P}(\bar{U})} \\ &\text{selon la formule des probas composées} \\ &= \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1) \mathbf{P}_{B_1}(B_2) \mathbf{P}_{B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{B_{k-1}}(\bar{B}_k) \\ &= \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \left(\frac{1}{n}\right)^{k-3} \left(\frac{n-1}{n}\right) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \left(\frac{1}{n}\right)^{k-2} \end{aligned} \quad (28)$$

car le premier tirage s'effectue dans l'urne V et comme il donne une boule blanche, le deuxième tirage s'effectue dans U ainsi que les suivants jusqu'au rang k puisque les tirages ne donnent

que des boules blanches, sauf le dernier. Alors selon () et () :

$$\begin{aligned} \forall k \geq 2, \mathbf{P}([X = k]) &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \left(\frac{n-1}{n} \right) + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \left(\frac{1}{n} \right)^{k-2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^{k-2} \left(\frac{n-1}{n} \right) \left(\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-2} \left(\frac{n-1}{n} \right) \end{aligned}$$

Conclusion : selon (26), (27) et (28)

$$\boxed{\forall k \geq 2, \mathbf{P}([X = k]) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-2} \left(\frac{n-1}{n} \right)}$$

2. X admet une espérance si et seulement si la série de terme général $k\mathbf{P}([X = k])$, $k \geq 1$ est convergente. Or pour tout $k \geq 2$:

$$\begin{aligned} k\mathbf{P}([X = k]) &= \frac{k}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-2} \left(\frac{n-1}{n} \right) \\ &= (n-1) \frac{k}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \end{aligned}$$

La convergence est assurée par le fait que $k\mathbf{P}([X = k])$ est proportionnelle au terme général d'une série dérivée d'une série géométrique de raison $\frac{1}{n}$ en valeur absolue strictement inférieure à 1. Ainsi X admet une espérance égale à :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(X) &= \mathbf{P}([X = 1]) + \sum_{k \geq 2} k\mathbf{P}([X = k]) \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k \geq 2} (n-1) \frac{k}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{n-1}{2} \sum_{k \geq 2} k \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{n-1}{2} \left(\sum_{k \geq 1} k \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{n-1}{2} \left(\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} - 1 \right) \\ &= \frac{3n-2}{2(n-1)} \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\boxed{\mathbf{E}(X) = \frac{3n-2}{2(n-1)}}$$

3. Pour des raisons évidentes de symétrie du contenu des urnes et des modalités de changement d'urne:

$$\boxed{X \text{ et } Y \text{ suivent la même loi}}$$

Maintenant on laisse au lecteur le soin de refaire la démonstration, s'il le veut !

4. Voici une proposition :

```

Program edhec_2007bis ;
Var x, n, tirage, hasard : integer ;
Begin
Randomize ; Readln(n) ; hasard := random(2) ; x := 0 ;
If hasard = 0 then begin x := x + 1 ; tirage := random(n) ;
                    If (tirage > 0) then
                        Repeat x := x + 1 ; tirage := random(n) ; until (tirage > 0) ;
                    end
                    Else Repeat x := x + 1 ; tirage := random(n) ; until (tirage > 0) ;
Writeln(x) ;
End.

```

Partie III

1. _

- (a) Là encore le protocole n'intervenant qu'à partir du second tirage, le résultat est exactement le même que celui obtenu dans **I.1.a** (avec le même raisonnement) :

$$\mathbf{P}([X = 1]) = \frac{1}{2}$$

- (b) Utilisons encore la *formule des probabilités totales* associée au système complet d'événements (U, \bar{U}) , cela donne :

$$\begin{aligned} \forall k \geq 2, \mathbf{P}([X = k]) &= \mathbf{P}_U([X = k]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}([X = k]) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k)) \quad (29) \end{aligned}$$

avec comme dans la question **I.1.b** :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_U(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) &= \mathbf{P}_U(B_1) \mathbf{P}_{B_1}(B_2) \mathbf{P}_{B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{B_{k-1}}(\bar{B}_k) \\ &= \left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \frac{n-1}{n} \text{ car les tirages se font toujours dans } U \quad (30) \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1} \cap \bar{B}_k) &= \mathbf{P}_{\bar{U}}(B_1) \mathbf{P}_{B_1}(B_2) \mathbf{P}_{B_2}(B_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{B_{k-2}}(B_{k-1}) \mathbf{P}_{B_{k-1}}(\bar{B}_k) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} \text{ car les tirages se font toujours dans } V \quad (31) \end{aligned}$$

Conclusion : selon (29), (30) et (31)

$$\begin{aligned} \forall k \geq 2, \mathbf{P}([X = k]) &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} \frac{n-1}{n} + \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)^{k-1} + n-1}{n^k} \right) \quad (32) \end{aligned}$$

et comme la formule reste valable pour $k = 1$ puisque :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)^0 + n-1}{n^k} \right) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1+n-1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

alors :

$$\forall k \geq 1, \quad \mathbf{P}([X = k]) = \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)^{k-1} + n-1}{n^k} \right)$$

- (c) X admet une espérance si et seulement si la série de terme général $\frac{k}{2} \left(\frac{(n-1)^{k-1} + n-1}{n^k} \right)$, $k \geq 1$, est convergente. Or comme ce terme général s'exprime comme combinaison linéaire de termes généraux de séries convergentes en tant que *séries dérivées de séries géométriques* de raisons respectivement égales à $\frac{n-1}{n}$ et $\frac{1}{n}$ strictement inférieures à un en valeur absolue. Ainsi X admet une espérance égale à :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(X) &= \sum_{k \geq 1} \frac{k}{2} \left(\frac{(n-1)^{k-1} + n-1}{n^k} \right) \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{k \geq 1} k \left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} + \left(\frac{n-1}{2n} \right) \sum_{k \geq 1} k \left(\frac{1}{n} \right)^{k-1} \\ &\quad \text{séparation légitime, toutes les séries sont cvtes} \\ &= \frac{1}{2n} \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)\right)^2} + \left(\frac{n-1}{2n}\right) \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} \\ &= \frac{n^2}{2(n-1)} \end{aligned}$$

Conclusion :

$$X \text{ admet une espérance égale à } \frac{n^2}{2(n-1)}$$

2. _

- (a) Par la *formule des probabilités totales* associée au système complet d'événements (U, \bar{U}) , nous avons pour tout $i \geq 1$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([Y = 2i]) &= \mathbf{P}_U([Y = 2i]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}([Y = 2i]) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \mathbf{P}_U(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{2i-1} \cap B_{2i}) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{2i-1} \cap B_{2i}) \mathbf{P}(\bar{U}) \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{P}_U(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{2i-1} \cap B_{2i}) + \mathbf{P}_{\bar{U}}(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{2i-1} \cap B_{2i})) \quad (33) \end{aligned}$$

avec en utilisant le même raisonnement qu'au **III.1.b.** :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_U(\bar{B}_1 \cap \dots \cap \bar{B}_{2i-1} \cap B_{2i}) &= \underbrace{\mathbf{P}_U(\bar{B}_1)}_{\text{noire dans } U} \underbrace{\mathbf{P}_{\bar{B}_1}(B_2)}_{\text{noire dans } V} \mathbf{P}_{\bar{B}_2}(\bar{B}_3) \times \dots \times \underbrace{\mathbf{P}_{\bar{B}_{2i-2}}(\bar{B}_{2i-1})}_{\text{noire dans } U} \underbrace{\mathbf{P}_{\bar{B}_{2i-1}}(B_{2i})}_{\text{blanche dans } V} \\ &= \underbrace{\frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \dots \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n}}_{2i-1 \text{ termes dont } i \text{ termes égaux à } \frac{n-1}{n} \text{ et } i-1 \text{ égaux à } \frac{1}{n}} \times \frac{n-1}{n} \\ &= \left(\frac{n-1}{n} \right)^i \left(\frac{1}{n} \right)^{i-1} \left(\frac{n-1}{n} \right) \\ &= \left(\frac{n-1}{n} \right)^{i+1} \left(\frac{1}{n} \right)^{i-1} \quad (34) \end{aligned}$$

car les tirs se font alternativement dans U (à tous les rangs impairs) et dans V (à tous les rangs pairs).

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_{\overline{U}}(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i-1}} \cap B_{2i}) &= \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{U}}(\overline{B_1})}_{\text{noire dans } V} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_1}}(\overline{B_2})}_{\text{noire dans } V} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_2}}(\overline{B_3})}_{\text{noire dans } V} \times \dots \times \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_{2i-2}}}(\overline{B_{2i-1}})}_{\text{noire dans } V} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_{2i-1}}}(B_{2i})}_{\text{blanche dans } U} \\
&= \underbrace{\frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \dots \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{1}{n}}_{2i-1 \text{ termes dont } i \text{ termes égaux à } \frac{1}{n} \text{ et } i-1 \text{ égaux à } \frac{n-1}{n}} \\
&= \left(\frac{1}{n}\right)^i \left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1} \frac{1}{n} \\
&= \left(\frac{1}{n}\right)^{i+1} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1}
\end{aligned} \tag{35}$$

car les tirs se font alternativement dans V (à tous les rangs impairs) et dans U (à tous les rangs pairs).

Conclusion : selon (33), (34) et (35)

$$\begin{aligned}
\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([Y = 2i]) &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{n-1}{n}\right)^{i+1} \left(\frac{1}{n}\right)^{i-1} + \left(\frac{1}{n}\right)^{i+1} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1} \left(\frac{1}{n}\right)^{i-1} \left(\left(\frac{n-1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \right) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1} \left(\frac{1}{n}\right)^{i-1} \left(\left(\frac{n-1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \right) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{i-1} \left(\frac{1}{n}\right)^{i-1} \left(\frac{n^2 - 2n + 2}{n^2}\right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)^{i-1}}{n^{2i-2}}\right) \left(\frac{n^2 - 2n + 2}{n^2}\right) \\
&= \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{i-1} \left(\frac{n^2 - 2n + 2}{2n^2}\right)
\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([Y = 2i]) = \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{i-1} \left(\frac{n^2 - 2n + 2}{2n^2}\right)$$

- (b) De même en utilisant toujours la *formule des probabilités totales* associée au système complet d'événements (U, \overline{U}) , nous avons pour tout $i \geq 1$:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}([Y = 2i + 1]) &= \mathbf{P}_U([Y = 2i + 1]) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\overline{U}}([Y = 2i + 1]) \mathbf{P}(\overline{U}) \\
&= \mathbf{P}_U(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i}} \cap B_{2i+1}) \mathbf{P}(U) + \mathbf{P}_{\overline{U}}(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i}} \cap B_{2i+1}) \mathbf{P}(\overline{U}) \\
&= \frac{1}{2} (\mathbf{P}_U(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i}} \cap B_{2i+1}) + \mathbf{P}_{\overline{U}}(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i-1}} \cap B_{2i+1})) \tag{36}
\end{aligned}$$

avec en utilisant le même raisonnement qu'au **III.2.a.** :

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_U(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i}} \cap B_{2i+1}) &= \underbrace{\mathbf{P}_U(\overline{B_1})}_{\text{noire dans } U} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_1}}(\overline{B_2})}_{\text{noire dans } V} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_2}}(\overline{B_3})}_{\text{noire dans } V} \times \dots \times \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_{2i-1}}}(\overline{B_{2i}})}_{\text{noire dans } V} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_{2i}}}(B_{2i+1})}_{\text{blanche dans } U} \\
&= \underbrace{\frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \dots \times \frac{1}{n} \times \frac{1}{n}}_{2i \text{ termes dont } i \text{ termes égaux à } \frac{n-1}{n} \text{ et } i \text{ égaux à } \frac{1}{n}} \\
&= \left(\frac{n-1}{n}\right)^i \left(\frac{1}{n}\right)^i \frac{1}{n} \\
&= \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \frac{1}{n}
\end{aligned} \tag{37}$$

car les tirs se font alternativement dans U (à tous les rangs impairs) et dans V (à tous les rangs pairs).

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_{\overline{U}}(\overline{B_1} \cap \dots \cap \overline{B_{2i-1}} \cap B_{2i+1}) &= \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{U}}(\overline{B_1})}_{\text{noire dans } V} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_1}}(\overline{B_2})}_{\text{noire dans } U} \mathbf{P}_{\overline{B_2}}(\overline{B_3}) \times \dots \times \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_{2i-1}}}(\overline{B_{2i}})}_{\text{noire dans } U} \underbrace{\mathbf{P}_{\overline{B_{2i}}}(B_{2i+1})}_{\text{blanche dans } V} \\
&= \underbrace{\frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n} \times \dots \times \frac{1}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \frac{n-1}{n}}_{\substack{2i \text{ termes dont } i \text{ termes égaux à } \frac{1}{n} \text{ et } i \text{ égaux à } \frac{n-1}{n}}} \\
&= \left(\frac{1}{n}\right)^i \left(\frac{n-1}{n}\right)^i \frac{n-1}{n} \\
&= \left(\frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \tag{38}
\end{aligned}$$

car les tirs se font alternativement dans V (à tous les rangs impairs) et dans U (à tous les rangs pairs).

Conclusion : selon (36), (37) et (38)

$$\begin{aligned}
\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([Y = 2i + 1]) &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \frac{1}{n} + \left(\frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \left(\frac{1+n-1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i
\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([Y = 2i + 1]) = \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i$$

et comme pour $i = 0$, $\frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n}\right)^i = \frac{1}{2}$ alors que $\mathbf{P}([Y = 1]) = \frac{1}{2}$ en reprenant le résultat (24) de la question **I.3** puisque les différents protocoles des tirages n'interviennent qu'à partir du deuxième tirage, nous pouvons écrire que :

$$\boxed{\forall i \in \mathbb{N}, \mathbf{P}([Y = 2i + 1]) = \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i}$$

(c) Comme les termes généraux dépend explicitement de n , on notera $(\mathbf{E}_{2p}(Y))_p$ et $(\mathbf{E}_{2p+1}(Y))_p$ les deux suites extraites, de $(\mathbf{E}_p(Y))_p$.

- On pose pour tout entier naturel p non nul $\mathbf{E}_{2p}(Y) = \sum_{k=1}^{2p} k \mathbf{P}([Y = k])$ avec :

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}_{2p}(Y) &= \sum_{k=1}^{2p} k \mathbf{P}([Y = k]) \\
&= \sum_{i=1}^p 2i \mathbf{P}([Y = 2i]) + \sum_{i=0}^{p-1} (2i+1) \mathbf{P}([Y = 2i+1]) \\
&= \sum_{i=1}^p 2i \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{i-1} \left(\frac{n^2-2n+2}{2n^2}\right) + \sum_{i=0}^{p-1} (2i+1) \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \\
&= 2 \left(\frac{n^2-2n+2}{2n^2}\right) \sum_{i=1}^p i \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{i-1} + \sum_{i=1}^{p-1} i \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{p-1} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i \\
&= 2 \left(\frac{n^2-2n+2}{2n^2}\right) \sum_{i=1}^p i \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{i-1} + \left(\frac{n-1}{n}\right) \sum_{i=1}^{p-1} i \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{i-1} + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{p-1} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^i
\end{aligned}$$

Nous reconnaissons à ce niveau trois sommes partielles de séries convergentes (*série géométrique* et sa *série dérivée* de raison strictement inférieure à un en valeur absolue). Par passage à la limite quand p tend vers l'infini :

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow +\infty} \mathbf{E}_{2p}(Y) &= 2 \left(\frac{n^2 - 2n + 2}{2n^2} \right) \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{n-1}{n^2}\right)\right)^2} + \frac{\frac{n-1}{n^2}}{\left(1 - \left(\frac{n-1}{n^2}\right)\right)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \left(\frac{n-1}{n^2}\right)} \\ &= 2 \left(\frac{n^2 - 2n + 2}{2n^2} \right) \frac{n^4}{(n^2 - n + 1)^2} + n^2 \frac{n-1}{(n^2 - n + 1)^2} + \frac{1}{2} \frac{n^2}{n^2 - n + 1} \\ &= \frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)} \text{ après simplifications} \end{aligned}$$

Conclusion : comme la limite existe et est finie :

la suite $(\mathbf{E}_{2p}(Y))_{p \geq 1}$ converge vers $\frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)}$

- On pose pour tout entier naturel p non nul $\mathbf{E}_{2p+1}(Y) = \sum_{k=1}^{2p+1} k \mathbf{P}([Y = k])$ et nous constatons (au lieu de tout refaire) que :

$$\mathbf{E}_{2p+1}(Y) = \sum_{k=1}^{2p} k \mathbf{P}([Y = k]) + (2p+1) \mathbf{P}([Y = 2p+1])$$

avec :

$$\begin{aligned} (2p+1) \mathbf{P}([Y = 2p+1]) &= (2p+1) \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{2p+1} \\ &\underset{p \rightarrow +\infty}{\sim} p \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{2p+1} \\ &\underset{p \rightarrow +\infty}{\sim} p \left(\frac{n-1}{n^2}\right)^{2p} \left(\frac{n-1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Or :

$$p \left(\left(\frac{n-1}{n^2}\right)^2 \right)^p = p \exp \left(2p \ln \left(\frac{n-1}{n^2}\right) \right)$$

avec :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} p \exp \left(2p \ln \left(\frac{n-1}{n^2}\right) \right) = 0 \text{ car } \ln \left(\frac{n-1}{n^2}\right) < 0$$

car par croissances comparées $\forall (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-\beta x} = 0$ ainsi :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} (2p+1) \mathbf{P}([Y = 2p+1]) = 0$$

d'où :

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow +\infty} \mathbf{E}_{2p}(Y) &= \lim_{p \rightarrow +\infty} \mathbf{E}_{2p+1}(Y) \\ &= \frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)} \end{aligned}$$

Ainsi les suites extraites de $(\mathbf{E}_p(Y))_{p \geq 1}$, de rang pair et de rang impair, sont convergentes vers une limite commune, ce qui induit que la suite $(\mathbf{E}_p(Y))_{p \geq 1}$ est convergente de limite

$$\frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)}. \text{ Ainsi :}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{p \rightarrow +\infty} \mathbf{E}_p(Y) &= \lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^p k \mathbf{P}([Y = k]) \\
&= \mathbf{E}(Y) \\
&= \frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)}
\end{aligned}$$

Conclusion :

Y admet une espérance égale à $\frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)}$

3. _

(a) Lorsque $n = 2$,

$$\begin{aligned}
\forall k \geq 1, \mathbf{P}([X = k]) &= \frac{1}{2} \left(\frac{(2-1)^{k-1} + 2-1}{n^k} \right) \\
&= \left(\frac{1}{2} \right)^k \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1}
\end{aligned} \tag{39}$$

et

$$\begin{aligned}
\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([Y = 2i]) &= \left(\frac{1}{4} \right)^{i-1} \left(\frac{2^2 - 4 + 2}{2 \times 2^2} \right) \\
&= \left(\frac{1}{4} \right)^i \\
&= \left(\frac{1}{2} \right)^{2i}
\end{aligned} \tag{40}$$

$$\begin{aligned}
\forall i \in \mathbb{N}^*, \mathbf{P}([Y = 2i + 1]) &= \frac{1}{2} \left(\frac{2-1}{2^2} \right)^i \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right)^i \\
&= \left(\frac{1}{2} \right)^{2i+1}
\end{aligned} \tag{41}$$

Selon (40) et (41) :

$$\begin{aligned}
\forall k \geq 1, \mathbf{P}([Y = k]) &= \left(\frac{1}{2} \right)^k \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1}
\end{aligned} \tag{42}$$

Conclusion : selon (39) et (42)

X et Y suivent la même loi, la loi $\mathcal{G}\left(\frac{1}{2}\right)$
--

- (b) Le fait que n soit égal à 2 rend la constitution des deux urnes U et V identiques (le passage de l'une à l'autre urne ne change rien) et dans ce cas les variables X et Y représentent des temps d'attente d'un premier succès (soit la première boule blanche, soit la première boule noire) de probabilité $\frac{1}{2}$ lors d'une série illimitée d'épreuves de Bernoulli indépendantes et de même paramètre.

4. Nous avons :

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{E}(Y) \leq \mathbf{E}(X) \\
 \Leftrightarrow & \frac{3n^2}{2(n^2 - n + 1)} \leq \frac{n^2}{2(n - 1)} \\
 \Leftrightarrow & 6n^2(n - 1) \leq 2n^2(n^2 - n + 1) \\
 \Leftrightarrow & 6n^3 - 6n^2 \leq 2n^4 - 2n^3 + 2n^2 \\
 \Leftrightarrow & 2n^4 - 8n^3 + 8n^2 \geq 0 \\
 \Leftrightarrow & 2n^2(n - 2)^2 \geq 0 \text{ ce qui est toujours vrai}
 \end{aligned}$$

Ayant raisonné par équivalences successives, nous pouvons affirmer que :

$$\boxed{\mathbf{E}(Y) \leq \mathbf{E}(X)}$$

le cas d'égalité étant trivialement obtenu pour :

$$\boxed{n = 2}$$

5. Voici une proposition de programme :

```

Program edhec_2007ter ;
Var x, n, tirage, hasard : integer ;
Begin
Randomize ; Readln(n) ; hasard := random(2) ; x := 0 ;
If hasard = 0 then Repeat x := x + 1 ; tirage := random(n) ; until (tirage = 0)
                Else Repeat x := x + 1 ; tirage := random(n) ; until (tirage > 0) ;
Writeln(x) ;
End.

```

