



## BANQUE COMMUNE D'ÉPREUVES

CODE SUJET :

296  
EML\_MATS

---

**Concepteur : EM LYON**

---

Première épreuve (option économique)

## MATHÉMATIQUES

Lundi 30 avril 2007 de 8 heures à 12 heures

*Les candidats ne doivent faire usage d'aucun document ; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.  
Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.*

---

TOURNEZ S.V.P.

## EXERCICE 1

On considère la matrice carrée d'ordre trois suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer, sans calcul, que  $A$  est diagonalisable.
2. Déterminer une matrice diagonale  $D$  et une matrice inversible et symétrique  $P$ , de première ligne  $(1 \ 1 \ 1)$  et de deuxième ligne  $(1 \ -1 \ 0)$ , telles que  $A = PDP^{-1}$ .  
Calculer  $P^{-1}$ .
3. Déterminer, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la matrice  $A^n$  par ses éléments.
4. Soient  $u_0, v_0, w_0$  trois nombres réels positifs ou nuls tels que  $u_0 + v_0 + w_0 = 1$ .

On note  $X_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$  la matrice colonne définie par la relation de récurrence :  $X_n = AX_{n-1}$ .

a. Montrer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $X_n = A^n X_0$ .

b. En déduire, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\begin{cases} u_n = \frac{1}{3} + \left(u_0 - \frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^n \\ v_n = \frac{1}{3} + \left(v_0 - \frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^n \\ w_n = \frac{1}{3} + \left(w_0 - \frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^n. \end{cases}$$

c. Déterminer les limites respectives  $u, v, w$  de  $u_n, v_n, w_n$  lorsque le nombre entier  $n$  tend vers l'infini.

On note, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $d_n = \sqrt{(u_n - u)^2 + (v_n - v)^2 + (w_n - w)^2}$ .

d. Montrer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $d_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ .

e. Déterminer un entier naturel  $n$  tel que :  $d_n \leq 10^{-2}$ .

## EXERCICE 2

### Préliminaire

On donne :  $0,69 < \ln 2 < 0,70$ .

On considère l'application :

$$g : ]0; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto g(x) = x^2 + \ln x.$$

1. Montrer que  $g$  est continue et strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  et déterminer les limites de  $g$  en 0 et en  $+\infty$ .
2. Montrer que l'équation  $g(x) = 0$ , d'inconnue  $x \in ]0; +\infty[$ , admet une solution et une seule.

On note  $\alpha$  l'unique solution de cette équation.

3. Montrer :  $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ .

### Partie A

On note  $I = \left[\frac{1}{2}; 1\right]$  et on considère l'application :

$$f : I \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x) = x - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}\ln x.$$

1.
  - a. Montrer que  $f$  est strictement croissante sur  $I$ .
  - b. Montrer :  $\frac{1}{2} < f\left(\frac{1}{2}\right) < f(1) < 1$ .
  - c. En déduire :  $\forall x \in I, f(x) \in I$ .
2. On considère la suite réelle  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ .
  - a. Calculer  $u_1$ .
  - b. Montrer :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I$ .
  - c. Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante.
  - d. Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et que sa limite est le réel  $\alpha$ .

### Partie B

On considère l'application :

$$F : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto F(x, y) = x e^y + y \ln x.$$

1.
  - a. Montrer que  $F$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$  et calculer les dérivées partielles premières de  $F$  en tout point  $(x, y)$  de  $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ .
  - b. Montrer que  $F$  admet un point critique et un seul que l'on exprimera à l'aide du nombre réel  $\alpha$ .
2. Est-ce que  $F$  admet un extremum local ?

### EXERCICE 3

1. On considère l'application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie pour tout nombre réel  $x$  par :

$$\begin{cases} f(x) = e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ f(x) = 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Montrer que  $f$  est une densité de probabilité.

On considère une variable aléatoire  $X$  admettant  $f$  pour densité.

2. On définit la variable aléatoire discrète  $Y$  à valeurs dans  $\mathbb{N}$  de la façon suivante :

- ★ l'événement  $(Y = 0)$  est égal l'événement  $(X < 1)$ ,
- ★ pour tout nombre entier strictement positif  $n$ , l'événement  $(Y = n)$  est égal à l'événement  $(n \leq X < n + 1)$ .

a. Montrer, pour tout entier naturel  $n$  :  $P(Y = n) = \left(1 - \frac{1}{e}\right)e^{-n}$ .

b. Montrer que la variable aléatoire  $Y + 1$  suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre. En déduire l'espérance et la variance de  $Y$ .

c. Recopier et compléter le programme ci-dessous pour qu'il simule la variable aléatoire  $Y$ .

```
program eml2007;
var y:integer; u:real;
begin
  randomize;
  u:=random; y:=...;
  while ... do
    ... ..
  writeln('y vaut ', y);
end.
```

3. Soit  $U$  une variable de Bernoulli telle que  $P(U = 1) = P(U = 0) = \frac{1}{2}$ .

On suppose que les variables aléatoires  $U$  et  $Y$  sont indépendantes.

Soit la variable aléatoire  $T = (2U - 1)Y$ , produit des variables aléatoires  $2U - 1$  et  $Y$ .

Ainsi,  $T$  est une variable aléatoire discrète à valeurs dans  $\mathbb{Z}$ , l'ensemble des entiers relatifs.

a. Montrer que la variable aléatoire  $T$  admet une espérance  $E(T)$  et calculer  $E(T)$ .

b. Vérifier que  $T^2 = Y^2$ .

En déduire que la variable aléatoire  $T$  admet une variance  $V(T)$  et calculer  $V(T)$ .

c. Pour tout nombre entier relatif  $n$ , calculer la probabilité  $P(T = n)$ .

4. Soit la variable aléatoire  $D = X - Y$ . On note  $F_D$  la fonction de répartition de  $D$ .

a. Justifier :  $\forall t \in ]-\infty; 0[$ ,  $F_D(t) = 0$ , et :  $\forall t \in [1; +\infty[$ ,  $F_D(t) = 1$ .

b. Soit  $t \in [0; 1[$ . Exprimer l'événement  $(D \leq t)$  à l'aide des événements  $(n \leq X \leq n + t)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

c. Pour tout nombre réel  $t \in [0; 1[$  et pour tout nombre entier naturel  $n$ , calculer la probabilité  $P(n \leq X \leq n + t)$ .

d. Montrer :  $\forall t \in [0; 1[$ ,  $F_D(t) = \frac{1 - e^{-t}}{1 - e^{-1}}$ .

e. Montrer que  $D$  est une variable aléatoire à densité. Déterminer une densité de  $D$ .