



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
Direction des Admissions et concours

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
E.S.C.P.-E.A.P.
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON
CONCOURS D'ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

OPTION SCIENTIFIQUE
MATHEMATIQUES I

Année 2006

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.

Ils ne doivent faire usage d'aucun document : l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

Pour tout couple (p, q) d'entiers strictement positifs, on note $\mathfrak{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à p lignes et q colonnes à coefficients réels.

Si A est un élément quelconque de $\mathfrak{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, on note A^T la transposée de A .

Dans tout le problème, pour n dans \mathbb{N}^* , on identifie \mathbb{R}^n et l'ensemble $\mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ des matrices colonnes à n lignes et à coefficients réels. L'espace vectoriel \mathbb{R}^n est muni de sa structure euclidienne canonique, le produit scalaire de deux vecteurs X et Y étant noté $\langle X, Y \rangle$ ou $Y^T X$.

Pour tout vecteur $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ de \mathbb{R}^n , sa norme est donnée par $\|X\| = \sqrt{X^T X} = \left(\sum_{k=0}^{n-1} x_k^2 \right)^{1/2}$.

Le module et le conjugué d'un nombre complexe z sont notés respectivement $|z|$ et \bar{z} . On rappelle que $|z|^2 = z\bar{z}$. Le nombre complexe de module 1 et d'argument $\pi/2$ est noté i .

L'objet du problème est l'étude de quelques propriétés de la matrice $H_n = \left(h_{k,j}^{(n)} \right)_{1 \leq k, j \leq n}$ (appelée matrice de Hilbert) de $\mathfrak{M}_{n,n}(\mathbb{R})$, de terme générique $h_{k,j}^{(n)} = \frac{1}{k+j-1}$, les entiers k et j décrivant $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la matrice H_n s'écrit donc

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Préliminaire

On rappelle que la restriction de la fonction tangente à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, admet une fonction réciproque notée \arctan . On note $(\arctan)'$ sa dérivée.

- (a) Pour tout réel x , rappeler l'expression de $(\arctan)'(x)$ en fonction de x .
(b) Montrer, pour tout x de \mathbb{R}_+^\times , l'égalité : $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$.
(c) tablir, pour tout x de \mathbb{R}_+ , l'encadrement : $0 \leq \arctan x \leq x$.
- (a) Montrer que la fonction ψ définie sur \mathbb{R} par $\psi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ est une densité de probabilité sur \mathbb{R} .
(b) Soit U une variable aléatoire réelle de densité ψ . On note F sa fonction de répartition. Déterminer la loi de la variable aléatoire $F(U)$.
(c) On rappelle que la fonction Pascal `random` rend un nombre aléatoire de l'intervalle $[0, 1]$ suivant une loi uniforme sur cet intervalle. Écrire, dans le langage Pascal, une fonction `Cauchy` simulant la variable aléatoire U .

Partie I : Dimension du sous-espace propre associé à la plus grande valeur propre de H_n

- Calculer, pour tout couple (k, j) de $\llbracket 1, n \rrbracket^2$, l'intégrale $\int_0^1 t^{k+j-2} dt$.

En déduire, pour tout vecteur $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ de \mathbb{R}^n , l'égalité :

$$X^T H_n X = \int_0^1 (x_0 + x_1 t + \dots + x_{n-1} t^{n-1})^2 dt$$

- (a) Justifier l'existence d'une matrice diagonale D à coefficients diagonaux strictement positifs, et d'une matrice orthogonale P telles que : $H_n = P D P^T$.
(b) On désigne par α_n (resp. β_n) la plus petite (resp. la plus grande) valeur propre de H_n . Montrer, pour tout vecteur X de \mathbb{R}^n , l'encadrement suivant :

$$\alpha_n \|X\|^2 \leq X^T H_n X \leq \beta_n \|X\|^2$$

- On note \mathcal{V} le sous-espace propre de H_n associé à la valeur propre β_n .
(a) Soit Y un vecteur de \mathcal{V} . Montrer que $Y^T H_n Y = \beta_n \|Y\|^2$.
(b) Réciproquement, soit Y un vecteur non nul de \mathbb{R}^n vérifiant $Y^T H_n Y = \beta_n \|Y\|^2$. Montrer que Y appartient à \mathcal{V} .

- Soit $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ un vecteur non nul de \mathcal{V} . On note $|X| = \begin{pmatrix} |x_0| \\ |x_1| \\ \vdots \\ |x_{n-1}| \end{pmatrix}$ le vecteur dont les composantes sont les valeurs absolues des composantes de X_0 .

- (a) Etablir l'inégalité : $|X_0|^T H_n |X_0| \geq X_0^T H_n X_0$.

- (b) En déduire que $|X_0|$ est un élément de \mathcal{V} .
- (c) Montrer que les composantes du vecteur $H_n |X_0|$ sont toutes strictement positives. En déduire que le vecteur X_0 n'a aucune composante nulle.
- (d) En utilisant le fait que $X_0^T H_n X_0 = |X_0|^T H_n |X_0|$, montrer que les composantes de X_0 sont toutes de même signe.
5. (a) Montrer qu'il n'existe pas deux vecteurs non nuls de \mathcal{V} orthogonaux.
- (b) En déduire la dimension du sous-espace propre \mathcal{V}

Partie II : Croissance et convergence de la suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$

On rappelle que β_n désigne la plus grande valeur propre de la matrice H_n .

1. Soit $X' = \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ \vdots \\ x'_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ un vecteur propre de H_n associé à β_n .

Soit Z le vecteur de \mathbb{R}^{n+1} défini par $Z = \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ \vdots \\ x'_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}$.

Montrer que $Z^T H_{n+1} Z = X'^T H_n X'$. En déduire que la suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$ est croissante.

2. Soit φ_1 et φ_2 deux fonctions définies et continues sur le segment $[a, b]$ de \mathbb{R} . On définit le nombre complexe $\int_a^b (\varphi_1(\theta) + i\varphi_2(\theta)) d\theta$ par :

$$\int_a^b (\varphi_1(\theta) + i\varphi_2(\theta)) d\theta = \int_a^b \varphi_1(\theta) d\theta + i \int_a^b \varphi_2(\theta) d\theta$$

et on rappelle que pour tout réel x , on a : $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

- (a) Calculer, pour tout k de \mathbb{Z} , les deux nombres complexes : $\int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\theta} d\theta$ et $\int_0^{\pi} e^{ik\theta} d\theta$.

- (b) Montrer, pour tout entier p de \mathbb{N} , l'égalité : $\int_{-1}^1 x^p dx = -i \int_0^{\pi} e^{i(p+1)\theta} d\theta$.

- (c) En déduire, pour tout polynôme P à coefficients complexes, l'égalité :

$$\int_{-1}^1 P(x) x dx = -i \int_0^{\pi} P(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta$$

- (d) Dans le cas où P est un polynôme à coefficients réels, établir l'inégalité suivante :

$$\left| \int_{-1}^1 P(x) dx \right| \leq \int_0^{\pi} |P(e^{i\theta})| d\theta$$

Dans les questions 3 et 4, on désigne par $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ un vecteur quelconque de \mathbb{R}^n .

3. (a) Etablir l'encadrement : $0 \leq X^T H_n X \leq \int_{-1}^1 (x_0 + x_1 t + \dots + x_{n-1} t^{n-1})^2 dt$.
- (b) En déduire que l'on a : $0 \leq X^T H_n X \leq \int_0^\pi |x_0 + x_1 e^{i\theta} + \dots + x_{n-1} e^{i(n-1)\theta}|^2 d\theta$.

4. (a) Soit φ la fonction définie sur \mathbb{R} par : $\varphi(\theta) = \left| \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{ik\theta} \right|^2$.

Montrer que φ est 2π -périodique et paire ; en déduire l'égalité : $\int_0^\pi \varphi(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{+\pi} \varphi(\theta) d\theta$.

- (b) Etablir l'inégalité : $X^T H_n X \leq \pi \|X\|^2$

- (c) En déduire que la suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$ est majorée, puis qu'elle est convergente.

Partie III : Limite de la suite (β_n)

Dans cette partie, le vecteur W de \mathbb{R}^n est défini par $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/\sqrt{2} \\ \vdots \\ 1/\sqrt{n} \end{pmatrix}$.

1. Montrer les égalités suivantes :

$$W^T H_n W = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{j}(k+j-1)} = \int_0^1 \left(\sum_{\ell=1}^n \frac{t^{\ell-1}}{\sqrt{\ell}} \right)^2 dt$$

2. En déduire, pour $n \geq 2$, l'inégalité suivante :

$$W^T H_n W \geq \sum_{p=2}^n \frac{1}{p-1} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{p-k}}$$

(on pourra utiliser le développement du produit de deux polynômes)

Dans les questions suivantes, p est un entier supérieur ou égal à 2.

3. (a) Etudier les variations de la fonction g définie sur $]0, p[$ par : $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x(p-x)}}$.

- (b) En déduire, quelle que soit la parité de p , l'inégalité suivante :

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{\sqrt{k(p-k)}} \geq \int_1^{p-1} \frac{dx}{\sqrt{x(p-x)}}$$

4. Justifier la validité du changement de variable $x = \frac{p}{1+t^2}$ dans l'intégrale $\int_1^{p-1} \frac{dx}{\sqrt{x(p-x)}}$, et établir la relation :

$$\int_1^{p-1} \frac{dx}{\sqrt{x(p-x)}} = \pi - 4 \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{p-1}} \right)$$

5. On pose : $u_p = \frac{1}{p-1} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{p-1}} \right)$. Montrer que la série de terme général u_p est convergente.

6. (a) Montrer que $\|W\|^2$ est équivalent à $\ln n$ lorsque n tend vers $+\infty$

- (b) En déduire la limite de la suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$.