

L'usage des machines à calculer est interdit

Exercice n° 1

Soient f et g les endomorphismes de \mathbb{R}^3 respectivement représentés dans la base canonique \mathcal{B} de \mathbb{R}^3 par les matrices A et B suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 12 & 3 & 8 \\ -12 & -4 & -9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

- 1°) Former les polynômes caractéristiques de f et g .
En déduire les valeurs propres de f et g .
- 2°) Déterminer, par leurs équations, les sous-espaces vectoriels propres de f et g .
- 3°) Construire une base \mathcal{B}' de \mathbb{R}^3 dont les vecteurs sont à la fois vecteurs propres de f et vecteurs propres de g ; La première composante non nulle de chacun de ces vecteurs sera obligatoirement prise égale à 1.
- 4°) Donner les matrices de passage directe et inverse de la base \mathcal{B} à la base \mathcal{B}' , ainsi que les matrices A' et B' qui représentent respectivement f et g dans \mathcal{B}' .

Exercice n° 2

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par :

$$a_0 = a_1 = 1, \text{ et} \\ (1) \quad a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1} a_{n-1}, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

- 1°) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, on a $1 \leq a_n \leq n^2$.
En déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.
- 2°) Soit $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ la somme de cette série.
Montrer que, dans un intervalle ouvert de convergence, S est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre que l'on établira (on pourra, par exemple, multiplier les deux membres de (1) par x^n et sommer pour n variant de 1 à l'infini. On notera (E) cette équation.
- 3°) En intégrant (E), expliciter la fonction S à l'aide de fonctions usuelles.
- 4°) Existe-t-il des solutions de (E) sur \mathbb{R} ?

Exercice n° 3

Le plan euclidien \mathbb{R}^2 est rapporté au repère orthonormal (O, \vec{i}, \vec{j}) . On désigne par p une constante réelle strictement positive donnée et par \mathcal{P} la courbe de représentation paramétrique :

$$t \in \mathbb{R} \mapsto M(t) \text{ défini par } \overrightarrow{OM}(t) = \frac{t^2}{2p} \vec{i} + t \vec{j}$$

- 1°) Reconnaître et représenter graphiquement \mathcal{P} .
- 2°) Former une équation cartésienne de la normale en $M(t)$ à \mathcal{P} .
- 3°) Discuter, suivant les valeurs du nombre réel θ , l'existence et le nombre de points $M(t)$ de \mathcal{P} différents de $M(\theta)$ tels que la normale en $M(t)$ à \mathcal{P} passe par $M(\theta)$.
- 4°) Montrer que les droites coupant \mathcal{P} en deux points distincts tels que les normales à \mathcal{P} en ces points se coupent sur \mathcal{P} , passent par un point fixe à déterminer.

Exercice n° 4

L'espace euclidien \mathbb{R}^3 est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On désigne par a une constante réelle strictement positive donnée, et par \mathcal{C} et \mathcal{S} respectivement la courbe et la surface de représentations paramétriques :

- $t \in \mathbb{R} \mapsto M(t)$ où $\overrightarrow{OM}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + at \vec{k}$ pour \mathcal{C}
- $(t, u) \in \mathbb{R}^2 \mapsto M(t, u)$ où $\overrightarrow{OM}(t, u) = (a \cos t - u \sin t) \vec{i} + (a \sin t + u \cos t) \vec{j} + (at + u) \vec{k}$ pour \mathcal{S}

1°) Préciser les points réguliers de \mathcal{S} .

Donner une équation du plan tangent à \mathcal{S} en un point régulier.

2°) \mathcal{S} est-elle une surface réglée ?

\mathcal{S} est-elle une surface développable ?

3°) \mathcal{S} est-elle engendrée par les tangentes à \mathcal{C} ?

4°) Pour $u \neq 0$, comparer le plan osculateur à \mathcal{C} au point de paramètre t et le plan tangent à \mathcal{S} au point de paramètres (t, u) .